

МастиБиоТест

ИНСТРУКЦИЯ. Часть 1

МастиБиоТест - набор используется для определения наличия патогенных микроорганизмов, вызывающих мастит, в образцах молока крупного и мелкого рогатого скота.

А) Набор «МастиБиоТест» содержит в себе:

1. Набор «Петритестов» с тремя оригинальными средами – для определения стрептококка (*Streptococcus spp.*), стафилококка (*Staphylococcus aureus*), бактерий группы кишечной палочки (БГКП).
Каждый «Петритест» позволяет культивировать только одну группу микроорганизмов, вызывающих мастит.
2. Стерильную одноразовую пробирку.
3. Одноразовые дезинфицирующие салфетки для сосков.
4. Стерильный инструмент для посева образца на «Петритест».

Б) Отбор проб молока для посева на «Петритест» и культивирования микроорганизмов:

1. Перед взятием пробы вымажи и соски необходимо тщательно вымыть от грязи, остатков навоза и т.д.
2. Из каждого соска 8 раз выдоить струй в отдельную тару.
3. Конец каждого соска продезинфицировать одноразовой салфеткой.
4. Взять пробу молока в прилагаемый стерильный контейнер (пробирку).

Пробу можно взять из большой части вымени, или из всех сосков сразу.



НПО «Альтернатива». Саратов, Шелковичная, 186, офис 511. +7 (8452) 53-80-43. Сайт: Petritest.ru

ПЕТРИТЕСТ

Микробиологические экспресс-тесты

МастиБиоТест

ИНСТРУКЦИЯ. Часть 2

Определение загрязненности:

1. Вскройте транспортировочный пакет, достаньте подложки «Петритест».
2. Вскройте индивидуальные упаковки блистеров. Откройте крышки и добавьте исследуемый образец молока объемом 0,2 мл пастеровской пипеткой (или стерильным шприцем) на питательные среды «Петритестов».
3. Разотрите материал по поверхности сред, шпателем, стеклянной палочкой с оправлением шаровидным концом или стерильным тупфером.
4. Плотно закройте крышку «Петритестов» и поместите их в термостат.
Для предотвращения образования конденсата рекомендуется размещать тесты в термостате дном вверх.
5. Термостатирование производится при температуре +37°C. Визуально первые результаты можно обнаружить уже через 4-6 часов, подтвержденные результаты через 24 часа.
6. Большинство бактерий образуют колонии различных цветов. Если присутствуют бесцветные колонии, их тоже следует учитывать при оценке плотности роста. В случае появления больших колоний следует помнить, что значение имеет плотность колоний, а не их размер.

Определение Стрептококков, Стапилококков, колiformных БГКП.

Стрептококки



Стапилококки



БГКП



Дальнейшие решения по выбору метода лечения необходимо принимать, исходя из результатов роста микроорганизмов на соответствующей питательной среде «Петритестов».

Утилизация использованных или просроченных тестов

При промышленном применении и при наличии активного роста микроорганизмов на «Петритесте» обеззараживание блистеров проводится автоклавированием либо с использованием дезинфицирующих средств с соответствующими режимами применения.

Сроки хранения подложек в наборе:

Стрептококк - 1 месяц (при +2 до +6°C) с даты изготовления.

Стапилококк и колiformные (БГКП) - 12 месяцев (при +2 до +6°C) с даты изготовления.